

Guide des insectes et rongeurs nuisibles, une propriété de :

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--|
| Extermination Terrebonne Inc. | 450-477-3932 | 1-800-361-9474 | www.exterminationterrebonne.com |
| Extermination Joliette Inc. | 450-759-5901 | 1-800-361-9474 | www.exterminationjoliette.com |
| Extermination St-Hubert Inc. | 450-676-2358 | 1-800-361-9474 | www.exterminationsthubert.com |

PETITE VRILLETTE

Anobium punctatum

APPARENCE

La petite vrillette mesure entre 2,5 à 6 mm de longueur, est de couleur brun foncé à noir. Sa tête est capuchonnée et on peut distinguer des rangées de points sur ses élytres.



ALIMENTATION

La petite vrillette attaque principalement les aubiers des résineux et des feuillus. L'aubier est la partie la plus tendre du bois. Les dommages qui y sont occasionnés sont des orifices d'envol circulaires à arêtes acérées de 1 à 2 mm de largeur. Ces trous compromettent la résistance du bois.

MŒURS

La petite vrillette vit près de l'homme, rarement dans la nature et c'est pourquoi on la surnomme *Vrillette domestique*.

REPRODUCTION

Sa période d'envol se situe d'avril à août. La larve mesure entre 4 et 6 mm de longueur et est de couleur ivoire, sa partie thoracique est munie de trois paires de pattes bien distinctes. Le développement de la larve s'étale entre 8 à 36 mois, dépendant de l'environnement et de la température. Dans certains cas exceptionnels, où les conditions s'étaient maintenues défavorables, cette période s'est prolongée jusqu'à dix ans !

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Elle est souvent confondue avec les lasiodermes ou stégobies. Ce ravageur du bois est le plus important des parasites s'attaquant aux biens culturels (sculptures, tableaux, meubles), car ils sont souvent faits dans de l'aubier. Les dommages aux bois de construction, beaucoup plus durs, sont de peu d'importance.